

VESPA^{NEU}

Späte, gesunde Hohertragsorte



| | | | |
|---|--|---|---------------------|
| | Kornertrag | sehr hoch | 9 |
| | Ölertrag | sehr hoch | 9 |
| | Ölgehalt | hoch | 7 |
| Gesundheit | | <i>durchschnittlich</i> | <i>hoch</i> |
| | Phoma | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | |
| | Cylindrosporium | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | |
| | Verticillium | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | |
| | TuYV | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | |
| | Kohlhernie | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | |
| Robustsorte für extensiveren Fungizideinsatz | | | |
| Standort | | <i>mittel</i> | <i>gut geeignet</i> |
| | Leichte Standorte (z. B. Sand, lehmiger Sand) | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | |
| | Gute Standorte (z. B. Löss & V, Lehm, Hügelland) | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | |
| | Schwierige Standorte (z. B. Marschen, Höhenlagen, Ton) | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | |
| Anbau und Ernte | Saattermin | früh <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Ø <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> spät | |
| | Herbstentwicklung | verhalten <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Ø <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> wüchsig | |
| | Wachstumsstart Frühjahr | früh <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Ø <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> spät | |
| | Winterhärte | gering <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Ø <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> hoch | |
| | Standfestigkeit | gering <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Ø <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> hoch | |
| | Druschtermin | früh <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Ø <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> spät | |
| | Druschkraftbedarf | gering <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Ø <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> hoch | |
| Idealer Drusch nach Weizen oder in Druschpausen | | | |

- Höchste Korn- und Ölertragseinstufung mit BSA-Note 9.
- Geringe Schossneigung im Herbst für frühere und mittlere Saaten.
- Sehr gute Stängelgesundheit, hohe Phomatoleranz.

